ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

ЗІННАТ™

оригінальний цефуроксим аксетил

Має високу клінічну ефективність при лікуванні респіраторних інфекцій[1]

Негоспітальна пневмонія	92%
Тонзиліт	97%
Синусит	89%
Гострий середній отит	93%

Р.п. МОЗ України № UA/5509/02/01, № UA/5509/02/02, № UA/5509/01/01, № UA/11807/01/01, № UA/11807/01/02, № UA/5509/02/03.

Виготовлено в Барнард Кастл, Велика Британія[2] — центральне виробництво цефалоспоринів «ГлаксоСмітКляйн», що поставляє Зіннат™ для більшості країн світу, зокрема для України

Показання. Лікування при інфекціях дихальних шляхів, ЛОР-органів, сечовивідних шляхів, шкіри та м'яких тканин, при гонореї та ранніх проявах хвороби Лайма. **Спосіб застосування та дози. Дорослі:** 250 мг двічі на добу — при більшості інфекцій, 125 мг двічі на добу — при інфекціях сечовивідних шляхів, 250 мг двічі на добу — при лікуванні пієлонефриту, 500 мг двічі на добу — при тяжких інфекціях. **Побічна дія.** Виражена помірно та має в основному зворотний характер: надмірний ріст *Candida*, еозинофілія, позитивний тест Кумбса, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, реакції гіперчутливості — шкірне висипання, кропив'янка, свербіж, медикаментозна лихоманка, сироваткова хвороба, анафілаксія; головний біль, запаморочення, гастроентерологічні розлади, включаючи діарею, нудоту, біль у животі, блювання, псевдомембранозний коліт, транзиторне підвищення рівня печінкових ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛДГ), жовтяниця, гепатит; поліморфна еритема, синдром Стівенса — Джонсона, токсичний епідермальний некроліз. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до антибіотиків цефалоспоринового ряду. **Передозування.** Можливе подразнення головного мозку і виникнення судом, усувається шляхом гемодіалізу і перитонеального діалізу. **Особливості застосування.** Немає досвіду застосування у дітей віком до 3 міс. З обережністю призначають пацієнтам з алергічними реакціями на бета-лактамні антибіотики в анамнезі. Під час лікування у пацієнта із хворобою Лайма відзначали реакцію Яриша — Герксгеймера, яка проходила без лікування. **Період вагітності та годування грудьми.** З обережністю призначають у перші місяці вагітності; цефуроксим виділяється з грудним молоком, тому у жінок, які годують грудьми, препарат необхідно застосовувати з обережністю.

З повною інформацією про препарат Ви можете ознайомитися в інструкції для медичного застосування.
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Повідомити про небажане явище чи подати скаргу на якість препарату Ви можете у ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за адресою: просп. П. Тичини, 1В, м. Київ, 02152, Україна. Тел.: (044) 585-51-85.

*Упаковка в саше.

[1]Адаптовано за: Skot L.J. et al. (2001) Cefuroxime axetil: an updated review of its use in the management of bacterial infections. Drugs, 61(10): 1455–1500.

[2]Інструкція для медичного застосування препарату Зіннат™.

UA/CFA/0020/14.03.11

GlaxoSmithKline