

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ

ЧАСОПИС

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

№ 3 (119)
2017

ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

- Пульс НАМН України: підсумки року та плани на майбутнє
- Столична медицина: вчора, сьогодні, завтра
- Обрії сучасних інновацій в акушерстві та гінекології
- Україна — Швеція: наука ніколи не зупиняється!
- Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні
- ХОЗЛ у дзеркалі GOLD-2017
- Кращі практики сімейної медицини з перших вуст. Зарубіжний досвід

НА СТИКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

- Безпека як сенс медицини

МЕДИЧНА ЕТИКА

- Біоетика і біобезпека: мультидисциплінарні аспекти

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

- Стандарти діагностики та лікування кислотозалежних і *Helicobacter pylori*-асоційованих захворювань

ЛІКАРЮ—ПРАКТИКУ

- Нефрологія «під мікроскопом».
- Гіперкаліємія та захворювання нирок
- Урсодезоксихолиєва кислота: можливості застосування в лікуванні хронічних захворювань печінки
- Сучасні підходи до комбінованої антигіпертензивної терапії: фокус на пацієнтів різного кардіоваскулярного ризику
- Сучасна стратегія невідкладної медичної допомоги при гіпертонічному кризі
- Біль у нижній частині спини та шіас: огляд діагностичних заходів і фармакотерапія
- Місце бетаксалолу в лікуванні серцево-судинних захворювань

МОРИОН

Для людей, живущих с сахарным диабетом**

Ультра современный ИНСУЛИН^{1,2}

Для уверенности
в будущем уже сегодня³⁻⁵



СТАБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ
24 часа в сутки и дольше^{7,8}

БОЛЕЕ НИЗКИЙ РИСК ГИПОГЛИКЕМИИ
в сравнении с инсулином гларгин 100 Ед./мл^{6, 8, 9}

УВЕРЕННОСТЬ В ДЛИТЕЛЬНОЙ
кардиоваскулярной безопасности^{8, 9}

**БАЗАЛЬНЫЙ ИНСУЛИН
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

**ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
ИНСУЛИНА ЛАНТУС®**
инсулин гларгин 100 Ед./мл

1. В Україні зареєстровано як Тожео СолоСтар (Тожео® SoloStar®).
 ** Лечение сахарного диабета у взрослых.
 4. Kozak M, et al. Diabetes Care 2014; 37(11):1911-1917.
 5. Bergerot R, et al. (Poster #947) presented at EASD, Vienna, September 10-14, 2014.
 6. Available from: <http://www.easdiabetesmeeting.org/resources/18574>.
 7. Yekutieli H, et al. (Poster #948) presented at EASD, Vienna, September 10-14, 2014.
 8. Available from: <http://www.easdiabetesmeeting.org/resources/18574>.
 9. Gostein HC, et al. New Eng J Med 2012; 367: 319-328.

Информация о препарате Тожео СолоСтар (Тожео® SoloStar®). Регистрационное свидетельство в Украине № UA/14720/01 (Тожео СолоСтар), приказ МЗ Украины № 724 от 04.11.2015, с изменениями от 21.09.2016, приказ МЗ Украины № 989.
Состав*.** Действующее вещество: инсулин гларгин. 1 мл раствора содержит инсулина гларгина 10,91 мг, что эквивалентно 300 Ед. инсулина гларгина. **Лекарственная форма.** Раствор для инъекций. **Фармакогруппа.** Противодиабетические препараты. Инсулины и аналоги длительного действия для инъекций. Код АТХ А10АЕ01. **Фармакологические свойства***.** Инсулин гларгин разработан как аналог инсулина человека, имеющего высокую растворимость в нейтральной среде. Инсулин гларгин полностью растворим в кислой среде (pH 4) раствора препарата. После введения в подкожные ткани инсулин нейтрализуется, что приводит к возникновению преципитата, из которого постепенно высвобождается небольшое количество инсулина гларгина. Самым важным действием инсулина, в том числе инсулина гларгина, является регуляция метаболизма глюкозы. Инсулин и его аналоги снижают уровень глюкозы в крови за счет стимуляции их потребления периферическими тканями, в частности скелетными мышцами и жировой тканью, а также угнетения образования глюкозы в печени. Инсулин подавляет липолиз в адипоцитах и липолиз, одновременно усиливает синтез белка. **Показания.** Лечение сахарного диабета у взрослых. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу, входящему в состав препарата. **Способ применения и дозы***.** Препарат Тожео СолоСтар является базальным препаратом инсулина для введения один раз в сутки, но желательны инъекции в одно и то же время. Схему введения препарата (дозу и время введения) следует подбирать в соответствии с индивидуальным уровнем глюкозы на лечение. При необходимости пациенты могут вводить препарат Тожео СолоСтар в интервалах до 3 часов до или после их обычного времени введения препарата. **Побочное действие***.** Гипогликемия, как правило, является наиболее частой побочной реакцией, которая наблюдается при инсулинотерапии. Она возникает, когда доза введенного инсулина превышает потребность в нем. Метаболические и соматотропные расстройства — очень часто (1/10); гипогликемия. Нарушение со стороны кожи и подкожных тканей — часто (1/10)–(1/10); липодистрофия; нечасто липодистрофия. Нарушение общего состояния и реакции в месте введения — часто (1/100)–(1/10); реакции в месте инъекционного введения препарата; редко (1/10 000)–(1/1000); отек. **Упаковка***.** № 1, № 3, по 1,5 мл в картридже, встроены в одноразовую шприц-ручку; по 1, 3 шприц-ручки в картонной коробке. Ионы в упаковке не включены. **Категория отпуска.** По рецепту.

*** Информация годна скорочення. С повною інформацією о препараті можна ознайомитися в інструкції по медичному використанню препарату, універсальній приказ МЗ України № 724 от 04.11.2015, с изменениями от 21.09.2016, приказ МЗ Украины № 989. Інформація для розміщення в спеціалізованих виданнях, призначених для медичних працівників, та фармацевтичних робітників, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах по медичній тематичі. Матеріал призначений виключно для спеціалістів здравоохорони. Перед використанням препарату обов'язково ознайомитися з повною інструкцією по медичному використанню препарату.

Тожео®
инсулин гларгин 300 Ед./мл

ПРЕОДЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ КОНТРОЛЯ®