Бонвива®

натрия ибандронат

В лечении постменопаузального остеопороза особенно важна уверенность в результате

- ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ОТВЕТА
  Увеличение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) на уровне поясничного отдела позвоночника и бедра через 2 года у более 93% женщин[1]
- БЫСТРОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЭФФЕКТА
  Увеличение МПКТ и нормализация биохимических маркеров остеопороза уже через 3 месяца[2]
- ДОКАЗАННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛОМОВ
  — снижение риска переломов позвоночника через 3 года на 62%[3]
  — снижение риска внепозвоночных переломов в группе высокого риска через 3 года на 69%[3]
- УДОБСТВО ПРИЕМА 1 таблетка в месяц[1, 2]
- БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЕРЕНОСИМОСТИ[2]

Литература
1. BONVIVA Summary of Product Characteristics.
2. Reginster JY et al. Ann Rheum Dis 2006; 65: 654–661.
3. Chesnut CH et al. J Bone Miner Res 2004; 19: 1241–1249.

Информация о лекарственном средстве приведена в сокращенном виде. Краткая инструкция по применению препарата БОНВИВА® размещена на с. 72.

Р. с. № UA/5164/01/01.

Медицинская информация о лекарственном средстве для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических специалистов. Для использования в рамках научно-практических конференций, съездов, конгрессов, семинаров, в специализированных изданиях.
Перед применением необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства.

№ UA.A.BON.01.02.2013

ООО «Рош Украина»
01030, Киев, ул. Б. Хмельницького, 19-21,10-й этаж
Тел. +38(044) 554 30 40, факс: +38 (044) 354 30 41
www.roche.ua